

**Capture.** — M. H. DONCKIER DE DONCEEL signale la capture à Lardy (Seine-et-Oise) du *Myrmeleu tetragrammica* [NEVR.], nouveau pour la région.

**Invasion de Lépidoptères.** — M. A. JANET signale une invasion de Lépidoptères qui a eu lieu au mois de septembre dernier dans la ville de São-Paulo (Brésil).

Il s'agit du *Myelobia smerintha*, insecte assez voisin par son aspect de notre *Phragmatobia castanea*.

L'invasion a duré plusieurs semaines et a été fort gênante par suite de l'amoncellement des corps de papillons dans les rues, comparable à l'enneigement de nos villes en hiver.

La place des *Myelobia* n'est pas parfaitement déterminée. Certains en font des Cossides, d'autres, par exemple HAMPSON, les classent parmi les Microlépidoptères malgré leur forte taille. L'envergure de certaines espèces atteignant 14 centimètres.

---

## Communications.

### Description d'un Lycide nouveau de Nouvelle-Poméranie (ancienne Nouvelle-Bretagne) [COL.]

par J. BOURGEOIS

**Metriorrhynchus basalis**, n. sp. — ♀. *Valde elongatus, parallelus, opacus, supra niger, thorace, scutello elytrorumque basi flavis; capite nigro, fronte pone insertionem antennarum transverse gibbosa, rostro brevi, apice recte truncato, labro magno, transverso, mandibulis flavidis, apice leviter infuscatis; antennis nigris, articulo 1<sup>o</sup> obconico, 2<sup>o</sup> brevissimo, r. c. conspicuo, sequentibus subcompressis, longitudine subaequalibus, latitudine autem sensim decrescentibus, apice oblique truncatis et ad angulum interiorem leviter productis, ultimo subcylindrico, apice obtuso; prothorace subquadrato, latitudine basali brevior, antice subrotundato, basi utrinque sinuata, disco distincte 7-areolato, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, acutis; scutello subquadrato, apice parum profunde triangulariter inciso; elytris parallelis, ad basin anguste flavis, costis 9, paribus fortioribus, imparibus humi-*

*lioribus, singulatim instructis, intercellis costarum clathris numerosis transversis in areolas regulares, densissimas divisis; corpore subtus nigro, prosterno, mesosterno, coris trochanteribusque flavis; abdominis segmento ultimo (7°) transverso, apice subtruncato, utrinque leviter sinuato. — Long. 17 mill. ; lat. 4 1/2 mill.*

♂ *Hucusque invisus.*

Nouvelle-Poméranie [Neu Pommern] : Rabaul (WOLF, 5 septembre 1909). Un seul individu ♀ (Musée Seckenberg, à Francfort-sur-le-Mein). Communiqué par M. L. VON HEYDEN.

Espèce voisine du *M. Doleschali* Redtb. (Reis. Novara, II, 4, 1868, Coleopt., p. 101, pl. 3, fig. 12), mais distincte par la tête noire, les élytres presque entièrement noires à l'exception d'une étroite bande basilaire et par le métasternum de cette même couleur. Dans les variétés les plus foncées du *M. Doleschali*, la coloration postérieure noire des élytres ne remonte pas au delà du milieu et le métasternum est toujours entièrement jaune.

---

### Diagnoses préliminaires de Bostrychides nouveaux du genre *Heterarthron* [COL.]

par P. LESNE.

1. *Heterarthron borneensis*, n. sp. (♀). — Long. 13 mill. *Corpus parallelum, nitidum, fulvum, pectore, abdomine femoribusque ditioribus, capite et prothorace quam elytris multo angustioribus. Clypeo antice medio depresso et submarginato, omnino edentato. Antennis 10-articulatis, articulis 3°-7° conjunctis quam 8° (id est clavae articulo 1°) multo brevioribus; clavae articulis magnis, compressissimis, foliiformibus. Pronoto modice transverso, antice leviter dilatato, disco tenuiter sat dense granulato. Elytris modice punctatis, punctulis subtilissimis intermirtis, declivitate apicali carina laminatim producta sursum altitudinem medii truncaturae assequente lateraliter marginata. Tarsorum articulo 2° a basi ad apicem leviter gradatim dilatato, nullo modo securiformi.*

Habitat : Bornéo N.-E., Elopura (W.-B. PRYER in coll. R. OBERTHUR). — 1 indiv.